



Scritto da Administrator
Sabato 02 Gennaio 2010 16:46

La prima indicazione di cheratocono (KC) per il paziente è una visione sfocata e distorta. Se viene diagnosti-

□



Nello stadio avanzato, il paziente può verificare una visione annebbiata a tratti in un occhio che sparisce-



La stessa immagine vista da un occhio normale e da un occhio con cheratocono allo stadio iniziale.
NB: I pazienti con KC potrebbero non notare differenze tra le 2 immagini... :-)



In questa immagine si può notare come il visus sia ancora buono nelle parti illuminate indirettamente (la...
Le luci invece tendono a creare effetti glow (bagliore) e flare (riflessi).
Più si è lontani dalle fonti luminose e più i riflessi tendono ad essere lunghi e fastidiosi.

QUALE E' LA CAUSA DEL CHERATOCONO?

Il KC è conosciuto da almeno due secoli, anche se non è stato descritto adeguatamente e distintamente.

Le cause del cheratocono sono ancora ignote nonostante la lunga esperienza medica. Non c'è stato un consenso su una causa specifica.

Un punto di vista scientifico vede il cheratocono sviluppato all'origine (per esempio per motivi genetici).

Un altro punto di vista vede il KC come una condizione degenerativa.

Un terzo punto di vista vede il KC derivato da processi di altre malattie.

Un'ipotesi meno accreditata suggerisce che il sistema endocrino può essere coinvolto. Questa idea si ba

L'influenza ereditaria nel 13% è suggerita dagli studi che dimostrano che il 50% dei gemelli mono-ovulari con la stessa

Vi consigliamo di leggere [Ricerca](#) per informazioni e regolazioni sulla salute

Ultimo aggiornamento Sabato 02 Gennaio 2010 16:50